

### 一、 安美速

17.7%安美速 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
十字花科包葉菜類	根瘤病	1. 定植前：5 毫升/每育苗盤 (59×30×3 公分)。 2. 定植後：9 公升/每公頃。	1. 定植前：100 倍。 2. 定植後：1,000 倍。				1. 定植前每盤灌注稀釋液 500 毫升 1 次。 2. 定植後 2 週每株淋灌稀釋液 300 毫升於根圈土壤 1 次。		淋灌後 24 小時內不再澆水。	延伸使用

### 二、 賽座滅

9.4%賽座滅 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
百香果	疫病	0.4-0.8 公升	2,000	雨季來臨前開始施藥	7-10	共 3 次		12		延伸使用

### 三、 達滅克敏

18.7%達滅克敏 WG

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
百香果	疫病	0.8-1.6 公升	1,000	雨季來臨前開始施藥	7	共 4 次		12		延伸使用

### 四、 依殺蟎

10.0%依殺蟎 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
百香果	葉蟎類	0.2-0.5 公升	3,500	害蟎發生初期施藥 1 次				3		延伸使用

## 五、 芬普蟎

### 5.0% 芬普蟎 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意 事項	說明
百香果	葉蟎類	0.4-0.8 公 升	2,000	害蟎發生初 期施藥 1 次				14		延伸使用

## 六、 氟尼胺

### 10.0% 氟尼胺 WG

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意 事項	說明
百香果	蚜蟲類	0.3-0.5 公 斤	3,000	害蟲發生時 施藥 1 次				14		延伸使用

## 七、 三氟派瑞

### 500 G/L (50% W/V) 三氟派瑞 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意 事項	說明
十字花 科包葉 菜類、 結球萵 苣	炭疽病	0.1-0.4 公 升	2,500	病害發生初 期開始施藥	7	共 2 次		14		延伸使用
茄子 辣椒 枸杞 香瓜茄 樹番茄	炭疽病	0.2-0.6 公 升	2,500	病害發生初 期開始施藥	7	共 2 次		7		延伸使用

## 八、 氟派瑞

### 400 G/L (40% W/V) 氟派瑞 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意 事項	說明
茄子 辣椒 枸杞 香瓜茄	根瘤 線蟲	0.1-0.4 公 升	3,000	於植株定植後 澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依					施用前請 保持土壤 濕潤。	延伸 使用

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
樹番茄				植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。						

#### 500 G/L (50% W/V) 氟派瑞 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
茄子 辣椒 枸杞 香瓜 茄 樹番茄	根瘤 線蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	延伸使用

#### 九、 嘉賜銅

##### 81.3% 嘉賜銅 WP

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
百香果	疫病	0.8-1.6 公斤	1,000	雨季來臨前開始施藥	7	共 2 次		6		延伸使用

#### 十、 滅特座

##### 9.0% 滅特座 EC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
印度棗	炭疽病	1.4-2.0 公升	750	結小果後開始施藥	10	連續 4 次		28		原始登記廠商：立農化學股份有限公司

## 十一、平克座

### 10.5%平克座 EC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
大豆	白粉病	0.18-0.2公升	4,000	病害發生初期開始施藥	10	最多3次		7		延伸使用

### 10.5%平克座 EC 刪除使用範圍

作物名稱	病蟲名稱	每公頃用藥量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施用次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	原公告日期	說明
豆菜類	白粉病	0.25公升	4000	病害發生初期開始施藥	10	3	-	6		0970825公告標示外使用	使用範圍重複

### 19.0%平克座 EW

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
大豆	白粉病	0.1-0.11公升	7,000	病害發生初期開始施藥	10	最多3次		7		延伸使用

### 25.0%平克座 WG

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
大豆	白粉病	0.07-0.08公斤	10,000	病害發生初期開始施藥	10	最多3次		7		延伸使用